UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI GEOLOGO

SECONDA SESSIONE 2013

PRIMA PROVA SCRITTA

Tema n. 1:

Il candidato descriva sinteticamente i metodi di rilevamento, le tecniche di indagine dirette e indirette, le prove di laboratorio eventualmente eseguibili, i metodi di controllo e descriva le possibile e più opportune tecniche di consolidamento per i seguenti movimenti gravitativi:

- planare incipiente (in un contesto tipo Bacino Terziario Piemontese);
- crollo di parete rocciosa a giacitura sub verticale.

Tema n. 2:

Il candidato illustri gli studi necessari per la valutazione delle risorse idriche in un contesto geologico di piana alluvionale.

Tema n. 3:

Il candidato descriva le problematiche geologiche connesse al reperimento e all'estrazione di materiali geologici (sciolti e lapidei) in un contesto geologico collinare.

SECONDA PROVA SCRITTA

TEMA n° 1

E' necessario procedere alla redazione degli studi geologici necessari alla Variante Generale del Piano Regolatore di un comune in ambito collinare (Zona di Tortona), recentemente classificato in Zona Sismica 3 (D.G.R. . 11-13058 del 19/01/2010 e D.G.R. 4-3084 del 12/12/2011).

Il candidato, dopo aver ricostruito il profilo geologico lungo il tracciato indicato (Allegato A) e, dopo aver sinteticamente inquadrato e caratterizzato dal punto di vista litostratigrafico e strutturale quanto graficamente rappresentato, individui:

1. quali carte tematiche devono essere redatte, specificando e motivando quali di quelle esistenti devono essere necessariamente aggiornate;
2. quali approfondimenti geologici, geomorfologici e geotecnici sono necessari (facendo anche riferimento al D.M. 14.01.2008)
3. quali sono le principali caratteristiche dei dissesti individuati in funzione delle possibili interferenze con gli insediamenti e le infrastrutture presenti (Allegato B = carta dei dissesti)
4. una forma di rappresentazione tabellare che consenta di legare il codice attribuito alle tipologie di dissesto con quelle che sono ritenute le voci essenziali per la redazione della carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'utilizzazione urbanistica (ai sensi della Circolare 7/LAP e della relativa Nota Tecnica Esplicativa)

Infine dovrà essere proposta una carta di sintesi schematica con relativa legenda (Allegato C – da tematizzare) da estendere anche alle aree non interessate dai dissesti.

LEGENDA

	Alluvioni ghiaiose, sabbiose e argillose attuali; alluvioni recenti terrazzate (A₂).		Marne di Cessole (Langhiano) Alternanze di marne siltose omogenee biancastre, con siltiti ed arenarie fini bioturbate. Nel settore orientale, intercalazioni di arenarie medie e grossolane in strati medi e spessi (Mc). <i>Depositi di piattaforma esterna</i>
	Alluvioni ghiaioso-sabbiose, fortemente alterate, con prodotti di alterazione sassistri (A₁).		Formazione di Costa Areaa (Burdigaliano - Langhiano basale) Alternanze regolari di marne emipelagiche e strati arenaceo-pelitici torbiditici. Nella parte sommitale (Val Lemme) prevalenza di marne siltose omogenee (Ca). <i>Depositi di piana sottomarina</i>
	Argille di Lugagnano (Pliocene) Marne grige omogenee; localmente sabbie gialle bioturbate (Villaivernia, Gazzana) (AI). <i>Depositi di piattaforma</i>		Formazione di Rigoroso (Oligocene - Miocene basale) Marne argillose grige o grigio verdastre con rari livelli cineritici o silicei. Nel settore compreso fra il T. Lemme e il T. Scivia, in corrispondenza della parte media della formazione, si intercalano strati decimetrici di arenarie medio-fini risedimentate (RI). Le marne suddette inglobano corpi arenacei a geometria lenticolare costituiti in prevalenza da arenarie medie e grossolane e arenarie conglomeratiche risedimentate; (RI₁); membro di Costa Montada; (RI₂); membro di Variano. <i>Depositi di scarpata e/o conoide sottomarina</i>
	Conglomerati di Cassano Spinola (Messiniano) Conglomerati in grossi banchi e sabbie subordinate (CS₁). Marne grige laminato con faune salmastre e locali livelli siltoso arenacei (Val Lemme, San Cristoforo) intercalate od associate ai depositi grossolani sopraccitati (CS₂). <i>Depositi di delta-conoide e lagunari</i>		Formazione di Monastero (Oligocene) Alternanze di argille marnose o marne siltose con arenarie fini torbiditiche in strati prevalentemente sottili. Localmente livelli conglomeratici e corpi arenacei costituiti da arenarie medie e grossolane in strati medi e spessi (Garbagna) (Mo). <i>Depositi di conoide sottomarina</i>
	Formazione Gessoso Solfifera (Messiniano) Argille, siltiti ed arenarie fini straterillate (GS) con locali lenti di gessi (GS₁) e calcari evaporitici a «gessi negativi» (GS₂). <i>Depositi lagunari</i>		Conglomerati di Savignone (Oligocene) Conglomerati in grossi banchi a ciottoli prevalentemente calcarei e di pietre verdi con locali intercalazioni arenacee (Co). <i>Depositi di delta conoide</i>
	Marne di S. Agata Fossili; Membro superiore (Tortoniano) Marne azzurre omogenee (Ma₂), con localmente (S. Alosio, il Poggetto) corpi conglomeratici lenticolari risedimentati (Ma_{2b}) associati ad arenarie, livelli caotici a blocchi di calcari organogeni e biocalcarenti (Ma_{2a}). <i>Depositi di scarpata</i>		Calcarei dell'Antola (Turoniano - Paleocene) Alternanze ritmiche di strati calcareo marnosi ed arenacei con strati argillosi marnosi (An).
	Marne di S. Agata Fossili; Membro inferiore (Tortoniano) Arenarie fini e siltiti bioturbate (Ma₁). Localmente (Vargo) corpi lenticolari, conglomeratico arenacei, risedimentati (Ma_{1b}), inglobati da sottili alternanze arenaceo pelitiche (Ma_{1a}). <i>Depositi di piattaforma esterna e, localmente (Vargo), di scarpata</i>		Faglie e loro probabile prosecuzione sepolta
	Arenarie di Serravalle (Serravalliano) Alternanze di marne siltose, siltiti ed arenarie fini bioturbate, con arenarie medio grossolane, bioclastiche, a stratificazione incrociata, arenarie grossolane gradate in strati spessi, arenarie medio-fini in strati sottili. Localmente lenti di arenarie conglomeratiche e conglomerati (S. Bartolomeo presso Gavi) (AS). <i>Depositi di piattaforma interna</i>		Giacitura degli strati

Dissesti di versante - Sant'Agata Fossili

[22/11/2013] -

Realizzazione a cura di ARPA Piemonte

Frane areali

Aree soggette a crolli/ribaltamenti diffusi

Aree soggette a frane superficiali diffuse

Aree soggette a sprofondamenti diffusi

Colamento lento

Colamento rapido

Complesso

Crollo/Ribaltamento

DGPV

Espansione

Scivolamento rotazionale/traslativo

Sprofondamento

SECONDA PROVA SCRITTA

TEMA n° 2

Una Società di Progettazione Ingegneristica deve decidere se ricorrere a sistemi tradizionali o alla geotermia per gli impianti di riscaldamento/refrigerazione di un grande centro commerciale.

L'intervento è previsto su un tratto di pianura con un substrato alluvionale, esemplificato nelle stratigrafie allegate alle pagine seguenti e inserito nella carta geologica allegata.

L'area di intervento ha forma rettangolare con un lato di 340 m di lunghezza orientato NS ed una superficie totale di circa 120.000 m².

La quota della base dell'acquifero superficiale lungo la direzione di flusso WE sulla cartografia ufficiale risulta compresa tra i 290 ed i 288 m slmm, mentre la quota del piano campagna lungo la stessa sezione WE è compresa tra 310 e 309 m slmm. La soggiacenza misurata su scala annuale varia tra 5,0 e 7,5 m all'estremo W e tra 6,5 e 8,0 all'estremo E.

Alla distanza minima di circa 150 m dall'area di intervento è presente un canale di irrigazione a regime stagionale (stagione calda: portate di 500-1000 l/s, stagione fredda: 0-50 l/s) con portata massima smaltibile di circa 2,5 m³/s, escluso eventuale trasporto solido.

Il candidato, dopo aver ricostruito il profilo geologico lungo il tracciato indicato (Allegato A), illustri alla luce della normativa pertinente (L.R. 22/96, Regolamento Regionale 29 luglio 2003 n. 10/R, D.D. n. 900 del 3/12/2012, D.Lgs 152/06 e s.m.i.) e motivando le scelte, un articolato programma delle indagini e degli studi necessari a valutare in via preliminare le condizioni di fattibilità dell'opera, nell'ipotesi che ci si orienti verso un sistema geotermico composto da uno o più pozzi di emungimento → scambiatore di calore → restituzione in recettore superficiale con una necessità di prelievo dell'ordine di 150 l/s continuativi, descrivendo inoltre i possibili effetti sulle condizioni ambientali (in senso lato) preesistenti.

SECONDA PROVA SCRITTA

TEMA n° 3

Durante lo sviluppo del progetto di fattibilità della coltivazione a cielo aperto, è stata richiesta la determinazione dei massimi angoli di inclinazione media che assicurino la stabilità globale della coltivazione considerando una altezza massima dei gradoni pari a 20m e una direzione di immersione dello scavo verso Sud.

Il rilievo geostrutturale ha evidenziato la presenza di 5 famiglie di discontinuità aventi le seguenti orientazioni:

Famiglia	Dip	Dip direction
K1	66°	298°
K2	68°	320°
K3	60°	360°
K4	58°	76°
K5	54°	118°

Durante il rilievo geostrutturale in sito, tramite il martello di Schmidt, si sono misurati differenti valori dell'indice di Schmidt caratteristici di una discontinuità naturale; i valori rilevati sono presentati in Tabella 1 ($\gamma = 25$ kzione di immersione delloN/m³).

37	41	45	38	47	45	38	41	39	50

Tabella 1: Valori misurati dell'impulso con il martello di Schmidt considerando un rilievo verso l'alto inclinato di 45°

Prelevato un campione contenente la medesima discontinuità, si è effettuata una prova di tilt test con la quale si è individuato un angolo di equilibrio limite a pari a 57°. Il campione ha forma parallelepipedo di base 50x30 cm. Il blocco superiore ha uno spessore di 20 cm.

In laboratorio sono state eseguite, inoltre, tre prove di taglio diretto su discontinuità artificiale che hanno permesso di determinare un valore dell'angolo di attrito residuo pari a 30° .

Si chiede di:

1. Costruire il profilo geologico lungo il tracciato indicato e, dopo aver citato e analizzato la normativa nazionale di riferimento, individuare le diverse problematiche geologiche che potranno presentarsi durante la realizzazione di una coltivazione a cielo aperto
2. utilizzando il criterio di Barton rappresentare sul piano $\tau - \sigma$ l'involuppo di rottura di picco e residuo;
3. determinare il valore dell'angolo di resistenza al taglio di picco delle discontinuità da assumersi nelle analisi di cui al punto 3;
4. determinare gli angoli di inclinazione media che assicurino la stabilità globale della coltivazione dopo aver effettuato i test cinematici allo scivolamento.

Disco

Detritio di falda a volte cementato.

Alluvioni attuali (a), terrazze fluviali antichi e recenti (b), costituiti da ghiaie, sabbie e limi.

Depositi ferrugini legati quasi interamente a meccanismi di correnti di torbida: sono costituiti da una associazione di strati poltico-arenacei e strati e banchi arenacei; si manifestano strutture da slumping. Abbiamo riscontrato: *Balminia marginalia*, *Globorotalia boronienensis*, *G. Crassiformis* e *Globigerina umbilicata*. "Formazione Mammoso-Arenacea della Valle del Belice".

Pliocene medio e superiore

Alternanza di calcari e marne a Globigerine "Trubi" con *Globorotalia puncticulata*, *Sphaeroidinellopsis* sp., *Globigerinoides* spp. Pliocene inferiore

Calcarei a <<Congerie>>: calcari e calcareniti organogeni di ambiente salmastro a *Melanopsis* e *Dreyssena* Messiniano superiore

Gessi selentici in grossi banchi con intercalazioni di livelli poltici (Il cido - Gessi di Pasquasia). Messiniano superiore.

Calcarei e calcareniti organogeni in grossi banchi, grigio-giallognoli, contenenti una macrofauna a prevalenti Pettinidi (*Pecten aduncus*, *Hirrites crispus*, *Arca syracusensis*) (a) con a tetto ed intercalate argille grigie fossilifere contenenti ostracodi (*Ohrfalunna sicula*), gasteropodi (*Nassarius dettonensis*), lamellibranchi (*Corbula giza*), foraminiferi (*Spiraloculina eggerata*, *Bolivina dentellata*, *Brizalina dentellata*) (b): "Formazione calcareo-Arenacea di Baucina".

Messiniano inferiore.

Depositi ferrugini, fluvio-deltizi: argille sabbiose con lenti di sabbie, arenarie e conglomerati (a); sabbie e arenarie grigio-giallastre a stratificazione intercalata, con intercalazioni di livelli poltici e conglomerati (b); conglomerati bruno-rossastri costituiti da sfenodi arrotolati di natura silico-arenacea e calcarea (c), variamente frammentati ed intercalati: "Formazione di Cozzo Terravecchia". Microfauna a *Globorotalia acostaensis*, *G. humerosa*, *Balminia echinata*, *Bolivina dentellata*. A tetto sono a volte presenti calcari biotermali (C da Portella S. Anna) (d). Tortoniano - Messiniano inferiore.

Marne e argille marnose di colore grigio-verdastro con granuli di glauconite ed una microfauna a prevalente plancton (*Globigerinabullicoides*, *G. falconensis*, *Globorotalia majeri*, *G. acostaensis*, *G. Continosa*, *Globorotalia alispina*, *Globigerinoides obliquus*, *Orybulina suturalis*, *O. Utriersa*). "Formazione delle Marne di San Cipirello".

Langhiano superiore - Tortoniano.

Calcareni glauconitiche più o meno cementate, con alternanze di livelli poltici bruno-verdastri e noduli fosfatici nella parte basale, in strati di alcuni decimetri di spessore, con tenore talora alto di clasti quarzosi, con fauna di mare basso ad Echinidi, denti di pesce, Gasteropodi, Lamellibranchi (*Arca*, *Siphopecten burdigalensis*), Cefalopodi. Burdigaliano - Langhiano basale.

Argille e argilliti brune, siliose, ricche in ossidi di ferro (a), con intercalazioni in banchi e lenti di livelli quarzarenitici e subordinatamente di quarzosititi compatte (b). Microfauna a *Catapsydrax dissimilis*, *Globorotalia delisicens*, *Globigerinoides trilobus*, *G. Primorthis*, *Globorotalia lugleri*, *Globigerina venezuelana*, *G. ciperoensis*.

Oligocene superiore - Miocene inferiore.

Calcoliti più o meno marnose tipo "scaglia" di colore bianco o rosato, in strati di spessore variabile (da qualche cm. ad alcuni dm) con noduli di selce a forma ameboidale o ellissoidale, di colore generalmente nero, che a volte danno luogo ad irregolari strutture stratiformi, talora passanti verso l'alto a calcari marnosi e marne di colore grigio-cenere con intercalazioni di calcareniti grigie (a), con livelli di brecciole nummulitiche addizionale (b). Microfauna a *Globorotalia opina opina*, *Globorotalia* sp., *Acarinia billbroti*, *Catapsydrax dissimilis*, *Hankentina argonensis*, *Turborotalia cerrozulensis pomeroi*, *Globotruncana arca*, *G. linniana*, *Bolivina drago*, ecc..

Cretaceo superiore - Oligocene medio.

Alternanza di marne e calcari marnosi con livelli spropoliti, in strati da centimetri a decimetrici, contenenti aplici e rostri di belemniti (*Duzalia lata*). Equivalente alla "Formazione Hybla".

Hauteriviano superiore - Albiano

Calcoliti tipo "Lattinusa", solitamente stratificate, di colore da rosa pallido a grigio chiaro, con noduli di selce a forma ameboidale o ellissoidale, di colore generalmente nero, che a volte danno luogo ad irregolari strutture stratiformi. La fauna è costituita in prevalenza da foraminiferi (*Calpionella alpina*, *C. aliplica*, *Calpionellopsis simplex*, *Cs. oblonga*) e molluschi (*Pygope dipha*). Verso il basso, l'accentuata stilglittizzazione della roccia crea strutture "nodulari".

Tionico - Neoceniano.

Calcarei a crinoidi e calcari pseudonodulari, mal stratificati, di colore nocciola e rosso-vinaccia, contenenti ricche faune ad ammoniti, belemniti e lamellibranchi (*Bositra buchii*), stratificati in grossi banchi, hanno uno spessore massimo di 10 metri.

Dogger - Malm inferiore.

Dolomie e calcari dolomiti a megadolonitidi, mal stratificati, passanti verso l'alto a calcari regolarmente stratificati in strati di 20-30 cm di spessore, con resti algali, ooliti, frammenti di crinoidi e lamellibranchi. Il colore varia dal grigio al rosato. Il contatto con i soprastanti calcari è marcato, a volte, da un livello manganesifero di spessore centimetrico (Montagna Grande), con floni sedimentari costituiti da bioncriti del Dogger-Malm inferiore (Rocca che Parla).

Trias superiore - Lias inferiore.